

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription
PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 BORGIO -

☎ (95) 36.05.70



Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 59
du 4 Juin 1985

VIGNE :

C'est la **floraison** pour de nombreux cépages. L'état sanitaire est satisfaisant, mais on observe de fréquentes attaques de **thrips** sur grappes, quelques foyers d'**oidium** et de **mildiou** sur ALERIA et PIANICCIA.



Floraison

*** Cicadelles de la flavescence dorée :

Le suivi des éclosions de **cicadelles de la flavescence dorée** (*scaphoideus littoralis*) est réalisé par les techniciens de la Protection des Végétaux, du CIVAM et des Chambres d'Agriculture de Haute Corse et Corse du Sud ; 40 parcelles sont ainsi régulièrement suivies depuis la fin Avril. Les premières sorties de ces **cicadelles** ont été enregistrées :

Le 21/05 à SARTENE
Le 24/05 à FIGARETTO
Le 28/05 à PATRIMONIO et AJACCIO

Les stades L2, L3 sont progressivement atteints. Des traitements aériens auront lieu sur les vignobles de Patrimonio, Ajaccio et Sartène dans la 2e quinzaine du mois de Juin.

Un prochain bulletin fera le point.

*** Oidium :

Effectuez un poudrage en pleine floraison.

*** Mildiou :

N'oubliez pas le traitement avant floraison pour les quelques parcelles n'ayant pas encore atteint ce stade.

*** Tordeuses de la grappe :

Le vol de première génération se termine. Le nombre de glomérules formés est resté très faible. Il est inutile de traiter.

P. 16



ARBRES FRUITIERS

Respectez toujours les délais d'emploi avant récolte.

*** Tordeuse orientale du pêcher :

Prévoir un traitement dès la fin de la semaine.

Vous pouvez utiliser les produits suivants :

- azinphos éthyl et méthyl.....	NB Spéc.....	15 Jours avant récolte		
- carbaryl.....	KUMITAL, SEVIN L 85...	7 Jours	"	"
- deltaméthrine.....	DECIS, DECIS FLOW.....	0	"	"
- dichlorvos.....	NB Spéc.....	5	"	"
- fénitrothion.....	NB Spéc.....	15	"	"
- fenvalerate.....	SUMICIDIN 10.....	21	"	"
- méthidathion	ULTRACIDE 20 BOUILLIE	15	"	"
- méthomyl.....	LANNATE 20 L.....	7	"	"
- mévinphos.....	NB Spéc.....	7	"	"
- oléoparathion + huile.....	NB Spéc.....	15	"	"
- parathion étyl et méthyl	NB Spéc.....	15	"	"
- phosalone.....	AZOPHENE, ZOLONE.....	15	"	"

ainsi que leurs associations.

En présence de **cochenilles** du murier préférer le méthidathion (ULTRACIDE BOUILLIE).

*** Coryneum sur pêcher :

Il se manifeste par des tâches bordées de rouge qui se détachent ensuite. La feuille apparaît percée de trous. Effectuez des pulvérisations à base de captane, zirame thirame.

*** Psylle du poirier :

Le traitement n'est justifié que si plus de 20 % des pousses sont occupées par des oeufs et larves.

Produits utilisables :

- amitraze..... TUDY MAITAC (produit également acaricides)
- phosmét..... IMIDAN

CULTURES MARAICHÈRES

*** Cladosporiose sur tomates :

Elle se manifeste par des tâches jaunes à la face supérieure des feuilles et une moisissure de couleur olive à la face inférieure. Intervenir dès les premières attaques avec :

- chlorothalonil..... DICONIL
- fenarimol..... RUBIGAN
- triforine..... SAPROL, DENARIN, FUNGINEX

Alterner les matières actives

*** Noctuelles terricoles ou vers gris :

Elles sont actives la nuit et consomment le collet et les racines des plantes. De couleur grise à verte, elles s'enroulent sur elles même si on les dérange. Des dégâts sont visibles sur la plupart des cultures maraichères.

Vous pouvez :

- traiter le sol avant plantation avec du VOLATON 5
 - ou épandre des appâts empoisonnés (SERVIN Appâts ou DURSABAN Appâts)
 - ou pulvériser :
- | | | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|---|---|
| - acephate..... | ORTHENE 50..... | 7 jours avant récolte | | |
| - cyperméthrine..... | CYMBUSH ou KAFIL SUPER | 7 | " | " |
| - deltaméthrine..... | DECIS..... | 3 | " | " |
| - perméthrine | AMBUSH..... | 15 | " | " |



Larve de noctuelle
(ver gris)